

Alsó bölcsességfog eltávolítása

Tájékoztató páciensek részére

Ahogy minden orvosi beavatkozás esetén, az alsó bölcsességfog-eltávolítás során bizonyos nem várt, nem tervezett következmények léphetnek fel, melyek fogorvosom és az őt segítő munkatársak legjobb szakmai tudása és szándéka ellenére is -az esetek csekély százalékában- bekövetkezhetnek.

Vizsgálataink azt mutatják, hogy az Ön alsó bölcsességfoga számára nem áll rendelkezésre elegendő hely ahhoz, hogy szokványos módon törjön elő és beilleszkedjen az alsó fogsorba. Ennek következtében teljes mértékben vagy részben a csontfelszín alatt (retencióban) marad.

Az érintett fog eltávolítását a következők miatt ajánljuk:

- A részben már áttört fogkorona körül ismétlődő, kellemetlen panaszokat okozó gyulladás keletkezhet
- a csontban elhelyezkedő fogkorona körül a csontot elpusztító ciszta alakulhat ki
- a bölcsességfog előtt elhelyezkedő őrlőfogat a rendellenesen előtörő bölcsességfog által kifejtett nyomás károsíthatja
- a rendellenesen előtörő fog körüli gyulladás a szervezet távolabbi részeire is áttérjedhet, ún. gócbetegséget okozhat
- a rendellenes irányban előtörő fog által kifejtett nyomás az egész alsó fogsort torzíthatja, harapási rendellenesség keletkezhet, fogszabályozó kezelés válhat szükségessé
- fogpótlások készítése előtt, későbbi szövődmények elkerülése miatt

A műtét menetének rövid ismertetése:

A beavatkozást helyi érzéstelenítésben végezzük. A **helyi érzéstelenítéssel** járó szövődmények előfordulása nem gyakori, azonban előfordulhat:

arcidegbénulás, vérömleny, szájjár, injekciós tályog, vértelen folt az arcon, kettős látás, azonos oldali látásvesztés, idegsérülés.

Helyi érzéstelenítésben (ritkán altatásban) leválasztjuk a fogínyt a csontról és fúró segítségével szabaddá tesszük a fogat. Ezt követően - elhelyezkedéstől, mérettől függően - egy vagy több darabban eltávolítjuk.

A műtétet követően arcduzzanat, szájnýtási- nyelési korlátozottság, fájdalom, hőemelkedés jelentkezhet, ezek a panaszok 3-4 nap alatt fokozatosan megszűnnek.

Amennyiben a fog eltávolítását követően varratok behelyezésére kerül sor, úgy azok eltávolítása 7-10 nap múlva esedékes.

Lehetséges szövődmények

Minden műtéti beavatkozást követően felléphetnek utóvérzések, sebgyógyulási zavarok, gyulladással járó panaszok, a gyakorlatban azonban általában nem kell további szövődményektől tartani.

Az alsó bölcsességfogak gyökerei - főként mélyen fekvő fogak esetében - az alsó állcsontban haladó ideg csatornájához igen közel eshetnek, így az ideg sérülése az esetek egy részében nem kerülhető el. Ez átmeneti, ritkán maradandó érzéskiesést, zsibbadást okozhat az alsó ajak azonos oldalán. Az ajak mozgásai nem károsodnak.

Ritka szövődmény az alsó állcsont belső felszíne mellett haladó - a nyelvet beidegző - ideg sérülése, mely bekövetkezhet az érzéstelenítés végzése során, de sérülhet a műtét kapcsán is. Ekkor átmeneti vagy tartós zsibbadás, érzés-ízérzés kiesés jelentkezik az érintett nyelvfelel. Ritkán előfordulhat a szomszédos fogak sérülése. Kifejezetten ritka szövődménynek számít az alsó állcsont törése, mely műtétilag vagy konzervatív úton eredményesen kezelhető.

Mi a teendő a beavatkozást követően?

Kérjük, hogy a műtét napján és az azt követő napon:

- ne dohányozzon, ne fogyasszon kávét vagy alkoholt
- tartózkodjon a testi megerőltetéstől, a sok beszédetől
- a műtéti terület fölé eső lágyrészeket hidegvizes borogatással, jegeléssel hűtse
- puha, tejmentes, pépes ételeket fogyasszon
- fogait az érintett helyen is óvatosan tisztítsa, de ne öblögessen
- A sebet ne szívogassa, ne használjon szívószálat, általában véve kerülje a vákuum-hatás kialakulását.

A műtét kapcsán alkalmazott érzéstelenítőszer, a beavatkozás okozta stresszhatás korlátozhatja az Ön gépjárművezetői képességeit. Kérjük tehát, hogy amennyiben ez megoldható, az injekció adását követően, 2-3 óra hosszan ne vezessen személygépkocsit, kerékpárt.

Kérjük, hogy az esetleges utóvérzésről, erőteljes duzzanat kialakulásáról, magas lázról, erős fájdalomról vagy más, az Ön általános állapotát érintő – a műtétet követően kialakult – panaszáról értesítse kezelőorvosát.

A kezelés alternatív terápiás lehetőségei, ezek kockázata:

A bölcsességfogakat, ha azok szuvasodnak, vagy begyulladnak, vissza-visszatérő panaszokat okoznak, ritka esetekben kezeljük konzervatív módon. Ha ez mégis fölmerül, úgy a fog tömése, esetleg gyökérkezelése lehet megfelelő alternatív terápia. Ezek a kezelések a bölcsességfogak nehezen hozzáférhető helyzete, valamint a jellemzően komplikált gyökéranatómiájuk miatt kisebb sikerrátával végezhetőek el, mint egyéb fogak esetén.

A kezelés elmulasztásának lehetséges következményei:



A tünetek fokozódása, gócos tünetek kialakulása is lehetséges. A letört fogak tovább törhetnek, a tüneteket még nem produkáló fogak idővel komoly fájdalmat, arcduzzanatot okozhatnak. Bizonyos pozícióban álló fogak a fogazat torlódását is okozhatják.