

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT GYÖKÉRCSÚCS-REZEKCIÓHOZ

Név: _____ TAJ szám: _____

Lakcím: _____ Kezelőorvos: _____

Kezeleni tervezett fog(ak) száma: _____

Fent nevezett páciens tudomásul veszem, hogy a gyökércsúcs-rezekció során bizonyos nem várt, nem tervezett következmények léphetnek fel, melyek fogorvosom és az őt segítő munkatársak legjobb szakmai tudása és szándéka ellenére is -az esetek csekély százalékában- bekövetkezhetnek.

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a gyökércsúcs körül, a csontban gyulladáshoz vezető folyamat alakult ki, („góc” sipolyképződéssel vagy anélkül) illetve cysta képződött. A fog megtartása érdekében ún. gyökércsúcs-rezekciót kell végezni. Fontos megjegyezni, hogy ez a beavatkozás csupán kísérlet a fog megtartása érdekében, az eredmény teljes biztonsággal nem garantálható.

A műtét menetének rövid ismertetése:

A beavatkozást helyi érzéstelenítésben végezzük. A **helyi érzéstelenítéssel** járó szövődmények előfordulása nem gyakori, azonban előfordulhat:

arcidegbénulás, vérömleny, szájjár, injekciós tályog, vértelen folt az arcon, kettős látás, azonos oldali látásvesztés, idegsérülés.

A beavatkozást megelőzően a gyökértömést tanácsos kicserélni.

Helyi érzéstelenítésben az ínyen vízszintes metszést ejtve, a gyökércsúcs felett található vékony csontreteget egy lencse nagyságú területen fúró vagy véső segítségével eltávolítjuk. Ezt követően végezzük el a gyökér amputációját, a gyökércsúcs, valamint a körülötte elhelyezkedő gyulladáshoz vezető szövetek eltávolítását. A műtétet megelőzően, illetve a műtét folyamán elkészített gyökértöméssel zárjuk le a gyökércsatornát a resectiós felületen.

A sebet ezt követően varratokkal egyesítjük. A varratok eltávolítása 7-10 nap múlva esedékes. A műtétet követően átmeneti arcduzzanat, fájdalom léphet fel. A műtét kapcsán keletkezett csontüreg a későbbiekben teljes értékű csontszövettel telődik ki. Fél-1 év múlva kontroll röntgenvizsgálat javasolt.

Lehetséges szövődmények

Minden műtéti beavatkozást követően felléphetnek utóvérzések, sebgyógyulási zavarok, gyulladásos panaszok, a gyakorlatban azonban nem kell további szövődeményektől tartani.

A felső frontfogakon végzett gyökércsúcsamputáció során – anatómiai okok miatt – megnyílhat az orrüreg. Hasonló következmény lehet a kis-és nagyőrlők resectiója alkalmával az arcüreg megnyílása.

Az alsó őrlőfogakon ritkán végzett resectió kapcsán sérülhet az alsó állcsontban található ideg, melynek eredményeként átmeneti vagy maradandó érzészavarok jelentkezhetnek.

Annak érdekében, hogy a szövődmények előfordulásának kockázatát minimálisra csökkentsük, kérjük, hogy válaszolja meg az alábbi kérdéseket!

1. Tudomása szerint rendelkezik-e Ön valamely gyógyszer, kémiai anyaggal szembeni túlérzékenységgel? Amennyiben igen, kérjük nevezze meg!
 igen: _____
 nem
2. Korábbi fogorvosi kezelések alkalmával jelentkeztek-e panaszai helyi érzéstelenítés alkalmazása, illetve a kezelések kapcsán?
 igen
 nem
3. Fogeltávolítás vagy sérülés kapcsán észlelt-e fokozott vérzést?

igen nem

4. Szed-e rendszeresen gyógyszereket? Amennyiben igen, kérjük nevezze meg!

 igen: _____ nem

Mi a teendő a beavatkozást követően?

Kérjük, hogy a műtét napján és az azt követő napon:

- ne dohányozzon, ne fogyasszon kávé vagy alkoholt
- tartózkodjon a testi megerőltetéstől, a sok beszédétől
- a műtéti terület fölé eső lágyrészeket hidegvizes borogatással, jégeléssel hűtse
- puha, tejmentes, pépes ételeket fogyasszon
- fogait az érintett helyen is óvatosan tisztítsa, de ne öblögessen
- A sebet ne szívogassa, ne használjon szívószálat, általában véve kerülje a vákuumhatás kialakulását.

A műtét kapcsán alkalmazott érzéstelenítőszer, a beavatkozás okozta stresszhatás korlátozhatja az Ön gépjárművezetői képességeit. Kérjük tehát, hogy amennyiben ez megoldható, az injekció adását követően, 2-3 óra hosszan ne vezessen személygépkocsit, kerékpárt.

Kérjük, hogy az esetleges utóvérzésről, erőteljes duzzanat kialakulásáról, magas lázról, erős fájdalomról vagy más, az Ön általános állapotát érintő – a műtétet követően kialakult – panaszáról értesítse kezelőorvosát.

A kezelés alternatív terápia lehetőségei, ezek kockázata:

A gyökércsúcs-rezekció a fog megmentéséért tett egyik utolsó lehetséges terápiás eljárás. Alternatívája lehet a fog eltávolítása. Az eltávolított fogat –ha fogorvosa másként nem rendelkezik- pótoltni javasolt, hogy elkerülje az állcsont leépülését, a környező fogak pozíciójának megváltozását, mely a harapási viszonyok felborulásával járhat, s további kellemetlenségekhez vezethet.

A kezelés elmulasztásának lehetséges következményei:

A tünetek fokozódása, gócos tünetek kialakulása is lehetséges. Az idő előrehaladtával romlanak a fog megmentéséért tett kísérletek sikerességének esélyei. Előfordulhat, hogy a műtét későbbre halasztása azzal jár, hogy a fog már nem menthető meg, azt el kell távolítani.

Garancia:

Mivel a gyökércsúcs-rezekció csupán egy kísérlet a fog megmentésére, a kezelés sikerességére garanciák nem adhatók. Amennyiben a fogat a műtétet követően el kell távolítani, a fogeltávolítás anyagi vonzatai a páciens terhelik. A sikertelen gyökércsúcs-rezekció árának visszai igénylésére a páciens ebben az esetben sem jogosult.

NYILATKOZAT

Kezelőorvosom, Dr. _____ az elvégzendő beavatkozás menetéről, az esetleges szövődményekről, a kezelés elmaradásának várható következményeiről számomra részletes felvilágosítást adott.

Az általa javasolt műtétbe:

- beleegyezem
 nem egyezem bele



DENTOP™

DENTOP FOGÁSZATI RENDELŐ

Megjegyzés:

Dátum: _____

Aláírással igazolom, hogy a fent felsorolt kockázati tényezőkkel tisztában vagyok, arról szóban és/vagy írásban tájékoztatást kaptam, lehetőségem volt kérdéseket feltenni, a kérdéseimre pedig kielégítő választ kaptam. A fogorvosom által javasolt kezelés(ek)be beleegyezem, fogorvosomat és az őt segítő munkatársakat a kezelés elvégzésére felhatalmazom.

Tájékoztatást kaptam a kezelés lehetséges alternatíváiról (amennyiben voltak), ezek következményeiről, beleértve a kezelés elmulasztását is.

A kezelésem költségéről szóban és / vagy írásban tájékoztatást kaptam.

Páciens
vagy törvényes képviselőjének aláírása

Fogorvos